

ត្រីតួបត្រសុខភាព មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

Calmette's Newsletter N° 02


ខែ មេសា ២០១៧ - មិថុនា ២០១៧

ត្រីតួបត្រលេខ ២

ស្ម័គ្រច្នៃ ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ



ពិធីសម្ពោធជាតិខ្មែរ ម៉េរីប្រាស់
ជាឆ្លងការម៉ាស៊ីន CT ស្តែនន័រ
ទំនើបថ្មី និង ឧបករណ៍
វេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនទៀត!



ពិគ្រោះជំងឺ
តាមការណាត់ជួប!



ហើមដើង

អំឡុងពេលមានផ្លូវពោះ
ជាសញ្ញាអាសន្នទីទេ?



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការទស្សនាវដ្តីនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត



ជំពាក់រយៀងៗ

ខែ មេសា ២០១៧ - មិថុនា ២០១៧ ទស្សនាវដ្តីលេខ ១

១

ពិនិត្យសម្រាប់ជំងឺ ធ្វើប្រាស់ជាឆ្លុះកម្រិតស៊ីន CT ស្តែនត៍ ដំណើរថ្មី និង ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនទៀត!

២

ស្ម័គ្រចិត្ត
ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
ផ្នែកវះកាត់ ឧទ្ធសីក ៣.៧ ២០១១ គ.ស ២០១៧

ហើមជើងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ជាសញ្ញាណាសន្តរិទេ?

៣

ហានិភ័យ

៤

ការប៉ះទង្គិច ឆ្អឹងកងក ទី២ ដល់ទី៧!

ពិគ្រោះជំងឺតាមការណាត់ជួប!

ការឈឺនៅកដៃ ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាល!

៧

ផលវិបាកនៃការសម្រាលកូនដោយវះកាត់!

៨

ជំងឺរើម អាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឬទេ?

៩

វេជ្ជសាស្ត្រដំណើរ បានសម្រោះជំងឺតម្កកជំងឺជំងឺកម្រ Guillain Barre!!!



ពិធីសម្ពោធជាត់ខ្សែ ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការម៉ាស៊ីន CT ស្ព្យែនន័រ ទំនើបថ្មី និង ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនទៀត!

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ដោយបានបើកទំព័រថ្មីមួយទៀត ដែលនឹងត្រូវកាត់ខ្សែបួន ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវម៉ាស៊ីន និង ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទំនើបជាច្រើន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល។ ដោយការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿន មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត បានបំពាក់ម៉ាស៊ីនCTស្ព្យែនន័រទំនើបថ្មី អមដោយបន្ទប់ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនតាមស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រសាកល។ ម៉ាស៊ីន CT ស្ព្យែនន័រថ្មីនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការ ស្រាវជ្រាវគ្រប់សរីរាង្គ មនុស្សបានយ៉ាងរហ័ស និង រូបភាពផ្តល់កាន់តែច្បាស់ល្អ និងលំអិតជាអតិបរមា។ បន្ថែមពីលើនេះ មន្ទីរពេទ្យក៏បានបំពាក់ឧបករណ៍ វេជ្ជសាស្ត្រ កម្រិតស្តង់ដារ ជាច្រើនទៀតមានជាអាទិ៍ ដូចជា៖

- ១) ម៉ាស៊ីនថតកាំរស្មីអ៊ិចមួយគ្រឿង ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនឌីជីថល Toshiba ដែលមាន បច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញគុណភាពរូបភាពកម្រិត ខ្ពស់ចុងក្រោយ។
- ២) ម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធបំពង់បញ្ជូន Pneumatic ជាបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ទំនើបរហ័ស អាចបញ្ជូនទីបណ្តាញពីគ្រប់ផ្នែក ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ទៅមន្ទីរពិសោធន៍ លើសពីនេះ អាចបញ្ជូន លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ ហ្វិល ឯកសារផ្សេងៗ ទៅគ្រប់ផ្នែកទូទាំង មន្ទីរពេទ្យ ក្នុងរយៈពេល យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមមួយទៅបីនាទី គឺជាមធ្យោបាយជំនួយក្នុងកិច្ចការវេជ្ជសាស្ត្រ អាចកាត់បន្ថយការ ប្រើប្រាស់គីលូវ៉ាតបានយ៉ាងច្រើនផង និងចំណេញពេលវេលាយ៉ាងលើសលប់ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពទាន់ពេលវេលាក្នុងការ ពិនិត្យព្យាបាលយ៉ាងបន្ទាន់បំផុត។
- ៣) ម៉ាស៊ីនវាស់មុខងារសួតពេញខ្លួនមនុស្ស (Body Plethysmography) ជាម៉ាស៊ីនទំនើបដែលផលិតពីសភាពអឺរ៉ុប នៃប្រទេស បែលហ្ស៊ិក ពី ក្រុមហ៊ុនជំនាញសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រ សម្រាប់ជំងឺសួតបេះដូង (Medisoft Cardio-Respiratory instrumentation) សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើ៖
 - សមត្ថភាពវាស់ជំងឺសួតខ្សោយ (Restrictive Disease) មានជំងឺក្រិនសព្វសាច់សួត (Diffuse Lung Disease) ជាដើម។
 - មានសមត្ថភាពវាស់ជំងឺត្រឡប់ត្រឡាចសួត មានដូចជា (Obstructive Disease): ប៊ីត (Asthma) រលាកសួត ទងសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) បង្កដោយបារី ឬផ្សែងផ្សេងៗ (post smoking or biomass) និងត្រឡប់ត្រឡាចសំឡេង (Principal air way obstructive) ព្រមទាំងមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺ វាយតម្លៃជាក់លាក់ពីសមត្ថភាពសួត មុនដាក់ថ្នាំសណ្តាំ (Pre anesthesia evaluation)។
- ៤) ម៉ាស៊ីនពិនិត្យបញ្ជាក់រកប្រភេទកោសិកាមហារីក(Immuno-hystochimie) ដែលអាច៖
 - ធ្វើតេស្តរក facteurs de prognostic និងជួយតម្រង់ទិសនៃការព្យាបាល ក្នុងជំងឺមហារីកសុដន់
 - អាចធ្វើតេស្តរកការខូចហ្វែន HER2 ដែលនាំឱ្យកើតមហារីកសុដន់
 - អាចធ្វើ sous typage របស់មហារីកកូនកណ្តុរ។

សូត្រថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

ឆ្នាំរកា ឧត្តម័ក ៣.ស ២៥៦១ គ.ស ២០១៧



ពិធីសូត្រមន្តបង្ការរាជសាសន៍ និងសម្តែងរបាំត្រៃសី ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរកា ឧត្តម័ក ៣.ស ២៥៦១ គ.ស ២០១៧ នាថ្ងៃសុក្រ ៧ មេសា ២០១៧ នៃមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត និងខ្លួនសព្វដ៏យល់ចិត្តមង្គលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជា។





ចលនាស្ត្រីក
កងក

ស្ត្រីកក
ក

ការប៉ះទង្គិច ឆ្អឹងកងក ទី២ ដល់ទី៧!

ក) មូលហេតុនៃការប៉ះទង្គិច៖

កត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចឆ្អឹងកងកនេះមាន៖ គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបើកបរ ធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ និងការលេងកីឡា។ល។

ខ) រោគសញ្ញា៖

នៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចនៅឆ្អឹងកងក ទី២ ដល់ទី ៧ វានឹងលេចឡើងនូវរោគសញ្ញាដូចជា៖

- ការឈឺកញ្ជឹងកខ្លាំង
- ស្លឹកដៃ
- ស្លឹកជើង
- កម្រើកដៃ និងជើងមិនរួច។

គ) ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ៖

ដើម្បីដឹងច្បាស់ពីរោគវិនិច្ឆ័យករណីនេះ ការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកជំងឺតាមរយៈគ្រូពេទ្យជំនាញ អមដោយការថតស្ថានភាព និងការស្ទង់រឿង (Rx, CTS, IRM) នឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅលើអ្នកជំងឺ ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ឃ) ការព្យាបាល៖

ទាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលរួមមាន ២ ករណី៖

- ទី១: ចំពោះការប្រេះ គ្រហឺតធូលី (Fracture stable) គឺតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺពាក់រណាបក រយៈពេលយ៉ាងតិច ៣ខែ។
- ទី២: ចំពោះការបាក់ឆ្អឹងដែលខូចពីទម្រង់ដើម (Fracture instable) ការវះកាត់ដោយចាប់ដៃកនៅផ្នែកខាងមុខនៃឆ្អឹងកងក ជាជម្រើសដែលល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាល។

ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល អាស្រ័យលើពេលវេលាពីពេលមានគ្រោះថ្នាក់ រហូតដល់ពេលព្យាបាល និង អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការប៉ះពាល់។ ប្រសិនបើបងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់ ឬការប៉ះទង្គិចទៅលើឆ្អឹងកងកនេះ សូមប្រញាប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យកាលបរមែត ដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជនរងគ្រោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងទាន់ពេលវេលា។



ពិគ្រោះជំងឺ តាមការណាត់ជួប!



ការណាត់ជួបជុំជាមុន ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន ក៏ព្រោះតែពេលវេលាកាន់តែមហិកទៅៗសម្រាប់មនុស្ស ម្នាក់ៗ។ ដោយសារតែមានសារៈសំខាន់យ៉ាងនេះហើយ មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត មានបំណងជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ដល់អតិថិជន ដែល ប្រើប្រាស់ សេវាពិគ្រោះជំងឺតាមការណាត់ជួបនេះ។

សារៈសំខាន់ និងផលប្រយោជន៍នៃការណាត់ជួបជាមុន៖

ក) ចំណេញពេលវេលា៖

- កាត់បន្ថយការរង់ចាំយូរ ដែលពុំសមាមាត្រនឹងចំនួនអ្នកជំងឺជំងឺច្រើនក្នុងពេលតែមួយ
- បង្កភាពងាយស្រួលដល់ទាំងអស់គ្នា (ទាំងបុគ្គលិក និងអតិថិជន) ក្នុងការបម្រើ និងការមកទទួលសេវា

ខ) អតិថិជនមានទំនុកចិត្ត និងអាចបន្តតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យដែលធ្លាប់បានជួបជាមួយ ឬជាមួយគ្រូពេទ្យដែលគាត់ចង់ជួប

គ) រក្សាបានរបៀបរៀបរយសម្រាប់អតិថិជន និងមន្ទីរពេទ្យ

ចំណាំ៖ ក្រុមការងារផ្នែកសម្របសម្រួល នឹងទំនាក់ទំនងរំលឹកបញ្ជាក់បន្ថែម រាល់ការណាត់ជួប ១ថ្ងៃ ឬ ២ថ្ងៃមុន។

ដើម្បីទទួលសេវាណាត់ជួបជាមុន នឹងទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីសេវាផ្សេងៗនៅមន្ទីរពេទ្យ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល វេបសាយ ឬបណ្តាញសង្គម៖

011 41 40 65 , 077 36 17 51 , 017 86 68 47 / Email: hospital@calmette.gov.kh / Website: www.calmette.gov.kh /

Facebook: www.facebook.com/calmette.gov.kh



ហើមជើងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ជាសញ្ញាអាសន្នរឺទេ?



១) មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យហើមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះរួមមាន៖

- លើសជាតិទឹកបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលអរម៉ូនអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (ជាបុគ្គលិកធម្មតាដែលកើតមានអំឡុងមានផ្ទៃពោះ)។
- ការសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមធំៗរបស់អាងត្រជាក់ (pelvic veins) ដោយទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់របស់ស្រ្តី ដែលធ្វើឲ្យលំហូរឈាមពីចុងជើងត្រឡប់មកបេះដូង យឺតជាងធម្មតានិងចាស់ឈាមបង្កជាការហើមជើង។ ដោយហេតុផលនេះ ការហើមភាគច្រើនកើតមាននៅអំឡុងពេលត្រីមាសទី៣នៃផ្ទៃពោះ ចំពោះស្រ្តីដែលមានទឹកភ្លោះច្រើន ឬ ពោះកូនភ្លោះ (ជាបុគ្គលិកធម្មតាដែលកើតមានអំឡុងមានផ្ទៃពោះ)។
- កង្វះជាតិអាឡប៊ុយមីន (Albumin) ដែលអាចបណ្តាលមកពីបាត់ជាតិសាច់តាមទឹកនោម (ជំងឺទឹកនោមប្រៃ)
- ជំងឺខ្សោយតម្រងនោម ឬ ខ្សោយបេះដូង ។ល។

២) សញ្ញាអាសន្ននៃការហើមជើងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រួមមាន៖

- កាលណាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមានហើមជើងបូករួមនិងសញ្ញាមួយចំនួនដូចជា៖
- លើសសម្ពាធឈាម - ហត់ដង្ហក់ - ទឹកនោមតិច - ជើងឡើងក្រហមហើយឈឺ -ល។

៣) វិធីព្យាបាល៖

- ក. បើជាការហើមមានសញ្ញាអាសន្ន គួរបញ្ជាក់រូបរាងមកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីវិភាគរកមូលហេតុឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងដើម្បីទទួលបានជំនួយ ឬការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ។
- ខ. បើគ្រូពេទ្យរកឃើញថាជាការហើមដោយមូលហេតុធម្មតានៃការមានគភ៌ នោះស្រ្តីយើងគួរអនុវត្តទម្លាប់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
 - គេងផ្លៀងមកខាងឆ្វេងដៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយការសង្កត់របស់ស្រ្តីទៅ លើសរសៃឈាមធំៗ។
 - ដាក់ជើងរបស់អ្នកឲ្យបានខ្ពស់ គ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបានដូចជា នៅពេលធ្វើការ ឬពេលគេង ឬ តម្រង់ជើងឲ្យបានញឹកញាប់ពេលអង្គុយលេង។
 - ជៀសវាងការអង្គុយគងអន្ទាក់ខ្លាញ់។
 - ខស្សាប្រាំផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ រឺដើរហាត់ប្រាណដើម្បីជួយចលនាឈាមហូរបានល្អ។
 - ចូរកុំបាក់ទឹកចិត្ត ព្រោះវាអាចបាត់ទៅវិញក្រោយពេលសម្រាលបុត្ររួច

“ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរតែមកតាមជាន និងពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំ។ ក្នុងករណីមានការហើមនិងក្តីបារម្ភណាមួយ គួរមកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញសម្តេច នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីទទួលបាននូវការប្រឹក្សានិងព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព។”

ការឈឺកដៃ
Wrist



ការឈឺនៅកដៃ ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាល!



ក) មូលហេតុនៃជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យមាន៖

- ការឈឺចាប់នៅកដៃ
- ម្រាមដៃចាប់កាន់អ្វីៗមិនបាន
- គាំងចលនាសន្លាក់
- ស្វិតសាច់ដុំ

លោកអ្នកគួរតែមានការចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយចលនាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងគោលបំណងពត់ចលនាសន្លាក់កដៃដែលគាំង បង្កើនចលនាកដៃ និង ម្រាមដៃការចាប់កាន់វត្ថុផ្សេងៗ និង ស្តារចលនាការងារប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ ដែលអាចបម្រើការងារបានដូចមធ្យម។

ខ) វិធីព្យាបាល៖

- ព្យាបាលដោយស្ត្រូសរវៃសម៉ាស៊ីន Micro Themy
- ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន Ultrasound

គ) តើត្រូវធ្វើចលនាលំហាត់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

- ការបត់និងលា កដៃ
- ត្រឡប់បាតដៃផ្តាច់និងផ្ទៃ
- ប្រអប់ដៃដាក់ទៅខាងមេដៃ និងទៅខាងក្នុងដៃ
- ទាញពន្លាតដោយបត់កដៃ
- ទាញពន្លាតដោយច្រត់កដៃ
- ចលនាបត់លាម្រាមដៃ

ការតាមដាន ការពិគ្រោះ ការពិនិត្យព្យាបាល ការស្តារចលនាប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ ជាមួយគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនាជាការចាំបាច់។ ដូចនេះ នៅពេលលោកអ្នកមានបញ្ហាឈឺនៅកដៃ លោកអ្នកគួរតែអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនានៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាល និងការណែនាំលំអិតបន្ថែមពីបញ្ហានេះ។



ផលវិបាកនៃការសម្រាលកូនដោយរះកាត់!

ជាទូទៅ ស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសម្រាលបុត្រតាមផ្លូវធម្មជាតិ ព្រោះផលវិបាកនៃការសម្រាលតាមធម្មជាតិ មានតិចតួចជាងការរះកាត់។ ករណីក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រេចធ្វើការរះកាត់ លុះត្រាតែការសម្រាលតាមធម្មជាតិអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះម្តាយនិងកូន។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអត្រានៃការសម្រាលបុត្រដោយការរះកាត់ មានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសការរះកាត់ដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ។ ស្ត្រីមួយចំនួនយល់ខុសថា ការសម្រាលកូនដោយរះកាត់ មាន ភាពងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការឈឺពោះសម្រាល និងមើលរំលងផលវិបាកផ្សេងៗទៅថ្ងៃអនាគត ដែលបណ្តាលមកពីការរះកាត់នេះ។ ដូច្នេះ តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះអំឡុង និងក្រោយពេលការរះកាត់សម្រាលកូន?

ក) ផលវិបាកអំឡុងពេលរះកាត់៖

- ផលវិបាកនៃថ្នាំសណ្តាំ (Syndrome de Mendelson)
- ការបាត់បង់ឈាមច្រើនពេលរះកាត់
- ការដាច់រំហែកកស្បូនខ្លាំង
- របួសប្លោកនោម ឬពោះរៀន ដែលទាមទារការសម្រាកពេទ្យរយៈពេលយូរ


ខ) ផលវិបាកក្រោយពេលរះកាត់ភ្លាមៗ ១០% ទៅ ៨២%៖

- ការបង្ករោគផ្សេងៗ មានដូចជា៖ ការរលាកប្លោកនោម រលាកភ្នាសក្នុងរបស់ស្បូន រលាកស្រោមពោះ ឬអាចដល់បង្ករោគក្នុងសរសៃឈាម។
- ការហូរឈាមក្រោយពេលរះកាត់ មានកកឈាមលើស្នាមរបួសស្បូនឬក្រោមរបួសស្បែក
- ភាពស្លេកស្លាំង
- ផលវិបាកស្ទះសរសៃឈាមតូចៗ ជាពិសេសសរសៃឈាមក្នុងស្មាតធ្វើឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវដង្ហើម

គ) ផលវិបាកក្រោយពេលរះកាត់ នៅពេលមានផ្ទៃពោះលើកក្រោយ ស្ត្រីអាចប្រឈមនឹង៖

- ការរះកាត់យកកូនសារជាថ្មី - ការធ្លាយស្បូន - សុករោងមាត់ស្បូន - សុកចាក់បូសក្នុងសាច់ស្បូន ឬចាក់ដល់ប្លោកនោម

ផលវិបាកទាំងអស់នេះមិនសូវកើតមានញឹកញាប់ទេ តែករណីខ្លះអាចគំរាមគំហែងដល់អាយុជីវិតស្ត្រីបាន។ ដូច្នេះរាល់ការសម្រាលទាំងអស់ស្ត្រីគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញជាមុន ដើម្បីជ្រើសរើសការសម្រាលមួយដ៏ សមស្រប និងមានសុវត្ថិភាពទាំងម្តាយនិងកូន។ វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសម្រាលនិងរោគស្ត្រី នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត នឹងផ្តល់ជំនួយនិងត្រឹមត្រូវជូនលោកអ្នក ក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសម្រាលបុត្រ។



ជំងឺវើមជាំជំងឺបណ្តាលមកអំពីវីរុសឈ្មោះ វ៉ារីសេឡា ហ្សូស្ទ័រ (Varicella Zoster Virus) ដែលបង្ហាញសញ្ញាលើស្បែកជាពងទឹក មានតូច មានធំ ផ្កាជាកញ្ចប់ជាផ្ទាំងៗ។ ពេលឆ្លងវីរុស វ៉ារីសេឡា ហ្សូស្ទ័រ ដំបូងវាបង្កជាំជំងឺអុតស្វាយ ក្រោយពេលជាសះស្បើយជាំជំងឺអុតស្វាយវីរុសនេះមិនងាប់ទេ វានៅសង្កត់ប្រព័ន្ធទឹករងៃ នៅពេលណាមួយសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយ (ប្រព័ន្ធភាពស្មាំ) វីរុសនេះនឹងរើឡើងបង្កជាំជំងឺវើម។



ជំងឺវើម អាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឬទេ?

ក) រោគសញ្ញា៖

នៅរយៈពេល ៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃ មុនពេលលេចចេញជំងឺនេះ អ្នកជំងឺមានអាការៈរាងអស់កម្លាំងក្តៅខ្លួនស្ទើរពេញៗ ស្រកៀវក្រហាយៗនៅលើស្បែក ដែលវាប្រុងនឹងលេចចេញ។ បន្ទាប់មកទើបវាចេញជាពងទឹកមានតូចមានធំផ្កាជាកញ្ចប់ជាផ្ទាំងៗ។ វាអាចចេញគ្រប់ទីកន្លែង នៅលើទ្រូង លើមុខ នៅដៃៗល។ ប៉ុន្តែវាចេញតែម្ខាង មិនដែលចេញទាំងសងខាងឬព័ទ្ធជុំវិញទេ។ ក្រោយចេញសញ្ញាលើស្បែកពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ ពងទឹកទាំងនោះក៏សះជាអស់ បន្ទុយតែស្នាមសម្លាកលើស្បែក និងការឈឺចាប់ក្រហាយលើស្បែកកន្លែងចេញ។ រោគសញ្ញាឈឺចាប់និងក្រហាយលើស្បែកនេះ អាចតិចឬខ្លាំង អ្នកខ្លះអាចបាត់ អ្នកខ្លះយូរអាចដល់ឆ្នាំ ទៅតាមសុខភាពបុគ្គលផ្សេងៗគ្នា។

ខ) វិធីព្យាបាល៖

អ្នកជំងឺត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវប្រើឱសថប្រភេទ Acyclovir លាប និងលេបរយៈពេល ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ។

សូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថា ជំងឺវើមអាចព្យាបាលជាដាច់មិនបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។ បើក៏លែងករណីពិសេស (កម្រជួប) ជំងឺវើមកើតលើអ្នកជំងឺមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងត្រូវសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

គ) វិធីការពារ៖

- វិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចជៀសវាងពីជំងឺវើម៖
- ចំពោះអ្នកមិនទាន់កើតអុតស្វាយត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតស្វាយ
 - ចំពោះអ្នកកើតអុតស្វាយរួចហើយត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺវើម។
- ប្រការត្រូវយល់ដឹង ចំពោះអ្នកជំងឺវើម៖
- ត្រូវដូតទឹកសំអាតខ្លួនប្រាណនិងសាប៊ូជាប្រចាំ
 - ត្រូវបរិភោគអាហារបំប៉នសុខភាព មិនតមអាហារអ្វីទាំងអស់។
 - មិនត្រូវស្មោះផ្លុំ ឬយកភ្លើងមកដុតលើស្បែកអ្នកជំងឺវើមទេ។

សូមលោកអ្នកធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណ និងការពារពីជំងឺអុតស្វាយនិងវើម ហើយប្រសិនបើមានករណីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៃជំងឺនេះ សូមមកពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋបណ្ឌិតជំនាញស៊ើស្បែកនៃមន្ទីរពេទ្យកាលប៉ែត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សា និងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

វេជ្ជសាស្ត្រទំនើប

បានសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺពីជំងឺក្រុម Guillain Barre!!!



ត្រីមរយៈពេលតែ៦ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ពីស្លឹកចុងដើងតិចៗរហូតដៃដើងទាំង៤ទន់ខ្លាំងកម្រើកលែងបាន ហើយចុងក្រោយសាច់ដុំជំនួយដង្ហើមចាប់ផ្តើម ខ្សោយបន្តទៀត ដែលឈានទៅដល់ការប្រឈមនឹងការដាច់ខ្យល់ភ្លាមៗ។ អាការៈជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ រួមទាំងការព្យាបាល ផ្សេងៗនៅខាងក្រៅមិនបានផលអ្វី ធ្វើឲ្យក្តីបារម្ភនិងអស់សង្ឃឹមកាន់តែកើនខ្លាំងឡើងៗ។ អ្នកជំងឺចាប់ដឹងខ្លួនថាគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការ បាត់បង់ជីវិត។ តែក្តីសង្ឃឹមបានចាប់ផ្តើមមានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានទទួលការពន្យល់ណែនាំឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំងឺមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត ដោយ លោកគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងម្នាក់។



ភ្លាមៗក្រោយពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យ អ្នកជំងឺត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ Guillain Barre កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។ គាត់ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញចម្រុះរួមមានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់ ផ្នែកប្រសាទសាស្ត្រ និងផ្នែកឯកទេសជំងឺឈាម នៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត។ ជាលទ្ធផលក្រោយការសង្គ្រោះដោយការប្តូរឈាមប្លាស្មាចំនួន ៤លើក ស្ថានភាពជំងឺបានធូរស្រាលយ៉ាងច្រើន ដែលនាំដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ អ្នកជំងឺ ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិ និងអ្នកជិតខាងទាំងអស់ ដោយអបអរសាទរ កោតសរសើរដល់លទ្ធផលល្អ ដែលមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់ថាក្រុម គ្រូពេទ្យជំនាញរបស់មន្ទីរពេទ្យអាចសង្គ្រោះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនេះឲ្យធូរសះស្បើយឡើងវិញរហូតដល់តែសោះ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយចេញពីមន្ទីរពេទ្យ អ្នកជំងឺអាចក្រោកឈរដើរបាននិងអាចប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាឡើងវិញ។ អ្នកជំងឺនិងក្រុម គ្រួសារបានធ្វើការកោតសរសើរដល់កិច្ចសហការជាផ្លែផ្កានេះ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់សមត្ថភាពព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញខ្មែរយើង។ គាត់បានអំពាវនាវដល់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាស្លឹកៗស្រដៀងគ្នានេះ ឲ្យប្រញាប់រួសរាន់មកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកប្រសាទ សាស្ត្រ ដើម្បីអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានរហ័ស និងទទួលបានការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា។ វេជ្ជសាស្ត្រទំនើបបានសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺទន់ដៃដើងទាំងបួន!!!



លេខ ៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
 ទូរស័ព្ទលេខ: ០១១ ៤១ ៤០ ៦៥, ០៧៧ ៣៦ ១៧ ៥១, ០១៧ ៨៦ ៦៨ ៤៧
 អ៊ីម៉ែល: hospital@calmette.gov.kh, វេបសាយ: www.calmette.gov.kh
 ហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/calmette.gov.kh